



## Kleintierpraxis

Dr. med. vet. Christoph Rüedi

Hirsriedweg 3, 3177 Laupen Tel. 031 747 97 70, Fax 031 747 57 50

E-Mail [info@ihrtierarzt.ch](mailto:info@ihrtierarzt.ch), [www.ihrtierarzt.ch](http://www.ihrtierarzt.ch)

### **FIP**

Die Feline Infektiöse Peritonitis (ansteckende Bauchfellentzündung der Katze) ist eine immer tödlich verlaufende Virusinfektion der Katze.

**Übertragung:** Die Ansteckung erfolgt durch direkten Kontakt mit einer kranken Katze oder indirekt über Gegenstände (Katzentoilette, Bürsten etc.). Da das Virus in der Umgebung sehr widerstandsfähig ist, empfiehlt es sich, 4-6 Monate zu warten bis man eine neue Katze anschafft.

**Symptome/Verlauf:** Beginnt in der Regel mit vermindertem Appetit, Fieber und Bewegungsunlust. Kann durch **Stress** ausgelöst werden.

Es gibt zwei Verlaufsformen:

- Feuchte FIP: Flüssigkeitsansammlungen in der Bauchhöhle, Brusthöhle oder dem Herzbeutel
- Trockene FIP: Erkrankungen der inneren Organe mit unterschiedlichen Krankheitssymptomen, schwer diagnostizierbar

Wir empfehlen diese Impfung bei Rassekatzen, Ausstellungskatzen und in Haushalten mit vielen Tieren. Ist in einem Haushalt schon einmal FIP aufgetreten, sollten neue/zusätzliche Katzen geimpft sein. Die Impfung kann ab der 16. Lebenswoche gemacht werden.